

Профилактика фетального алкогольного синдрома во Франции

Д-р Кармен Крефт-Жаис
Дирекция научного отдела

Национальный институт по профилактике и санитарному просвещению

Распространенность ФАС во Франции

- Коллективное исследование Национального Института Здоровья и медицинских исследований (INSERM) «Воздействие алкоголя на здоровье» (2001): от 0,9 до 2,8 детей на 1000 живорожденных
- Контрольное исследование (2006-2008) проведенное Институтом санитарно-эпидемиологического надзора (InVS), опубликованное в 2009 г.: от 0,06 (0,01-0,18) до 0,81(0,32-1,67) на 1000 живорожденных в зависимости от того, учитываются ли случаи ФАС с или без гипотрофии,  о чем не всегда сообщается
- Эти данные сопоставимы с общими данными, полученными в западных странах, где распространенность ФАС составляет от 0,5 до 3 случаев на 1000 живорожденных


Во сколько обходится ФАС во Франции (от рождения до 20 лет)

- Данные, полученные в результате исследования детей с ФАС в Гавре (С.Гийе, Семинар по ФАС во Франции в Сенате, 24.9.2009):
 - Уход за новорожденным
 - Госпитализация
 - Медицинская страховка до 6 лет
 - Пребывание ребенка в социальном учреждении до 18 лет (приемная семья, ясли)
 - Пребывание в медико-воспитательном учреждении (экстернат) до 20 лет

около **520 000 евро** на человека
от рождения до 20 лет

Во сколько обходится ФАС во Франции (на протяжении всей жизни)

- Экстраполяция канадского исследования (Nguyen Xuan Thanh et al, Fetal alcohol spectrum-disorder-Management and Policy Perspectives of FASD, 2011 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, KGaA, Weinheim)




- Уход на протяжении жизни обходится в **1,3 миллиона евро**

Работа, проводимая во Франции

- Статья L3322-2 Кодекса о Здравooхранении (11.2.2005) предусматривает обязательное указание на любой таре с напитком, содержащим алкоголь, «медицинской рекомендации об отказе от употребления алкоголя беременными женщинами»,
- Постановлением от 2 октября 2006 г. определяются условия размещения предупредительной надписи на этикетке на таре с алкогольными напитками:
 - **Пиктограмма или**
 - **Следующая надпись (дословно): « Употребление алкогольных напитков во время беременности, даже в небольшом количестве, может серьезно отразиться на здоровье ребенка»**
- Постановление вступило в силу 3 октября 2007г.


Меры, принимаемые во Франции



Zéro alcool pendant la grossesse

Москва, 23-24 января 2012 г.

Брошюры, афиши, флайеры, памятки...



Москва, 23-24 января 2012 г.

Меры, принимаемые во Франции

- Материалы об употреблении алкоголя, подготовленные Национальным Институтом по профилактике и санитарному просвещению (НИПСП) для широкой аудитории
- Материалы НИПСП специально для беременных женщин
- Материалы НИПСП «Питание во время беременности»
- Медицинская карта беременной, одобренная Министерством Здравоохранения
- Участие в акции «беременность – нет алкоголю»
- Барометр здоровья (периодический опрос, проводимый НИПСП, для изучения привычек, знаний, отношения и мнения французов относительно питания и здорового образа жизни)

Беременные женщины и употребление алкоголя (Барометр здоровья 2010)

➤ В опросе участвовало 27 653 человека

| | Беременные женщины (n=284) | Небеременные женщины (n=8247) |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Употребление алкоголя (%) | | |
| ежедневное | 0,0 | 1,1 |
| в течение недели | 2,9 | 24,4 |
| в течение месяца или (-) | 29,1 | 54,3 |
| отсутствует | 68,0 | 20,2 |

Беременные женщины и употребление алкоголя (Барометр здоровья 2010)

- **32%** женщин продолжают употреблять алкоголь во время беременности, но делают это реже: **2,9%** употребляют алкоголь раз в неделю, в отличие от **25,5%** небеременных женщин
- Женщины, продолжающие употреблять алкоголь во время беременности, уменьшают количество выпитого: в среднем **0,6** бокала в неделю против **2,5** бокалов для небеременных женщин
- Около **60%** женщин полностью прекратили употребление алкоголя во время беременности

Материалы Министерства Здравоохранения (июнь 2011)



Москва, 23-24 января 2012 г.

Алкоголь во время беременности, поговорим об этом справочник для специалистов

- Материалы Министерства Здравоохранения, выпущенные в июне 2011г.
- Работа группы экспертов, в которую вошли работники здравоохранения, работники медико-социального сектора и административные работники
- Цели:
 - ✓ Беседа с беременной женщиной о том, употребляет ли она алкоголь
 - ✓ Глобальная политика: информирование населения, ссылки на хорошую клиническую практику, педагогические приемы
 - ✓ Необходимо как можно раньше начинать индивидуальную работу с каждой беременной женщиной

Москва, 23-24 января 2012 г.

Меры, принимаемые на уровне региональных и территориальных административных единиц

- **Департамент Нор-Па-де-Кале:** координация действий между акушерскими клиниками и наркологической службой, что упрощает лечение и наблюдение за женщинами, склонными к употреблению алкоголя
- **Остров Реюньон:** создание целостной программы, включающей профилактику, лечение женщин, склонных к употреблению алкоголя, раннее диагностирование и уход за детьми с ФАСН, при активном сотрудничестве с Региональным Агентством Здравоохранения, Минобразования и юстиции (Д-р Дени Ламблен)

Дальнейшие планы по развитию мер во Франции

- Привлечение внимания общественности
- Привлечение внимания беременных женщин и женщин детородного возраста
- Привлечение внимания работников здравоохранения
- Опросы общественного мнения и распространение информации среди беременных женщин
- Междисциплинарная рабочая группа для работы в национальном масштабе (Министерства здравоохранения, образования и юстиции...)
- Создание Национального информационного центра по ФАС и ФАСН