

ОПЫТ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПГПЖ В ЕВРОПЕ В 1970–2010 ГГ.

Илкка Вохлонен, профессор

Москва,
15.10.2014

Директор по науке
UEF, FCG



ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЯ ПГПЖ

- Различия в возрасте смерти и ожидаемой продолжительности жизни (лет/100 000 граждан)
- Классификация в соответствии с причинами предотвратимой смерти (МКБ-10/ВОЗ)
- Стандартизация по возрасту вследствие различий в возрастной структуре целевой группы населения (в особенности это касается молодых граждан)
- Для международного и хронологического сравнения ожидаемая продолжительность жизни должна быть постоянной (неизменной)

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПППЖ ЗА 1970—2010 ГГ.*

	1970	1980	1990	2000	2010
• ШВЕ	5786	5045	4129	3094	2486
• ФРА	7658	6551	5323	4310	3440
• ФИН	8543	6260	5755	4165	3556
• КАН	7968	6301	4817	3642	3006

* На 100 000 граждан (Данные по здоровью ОЭСР, 2014 г.)

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПГПЖ И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ПО ВОЗРАСТУ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ (СКС) В 2000 и 2010 гг.

	2000 ПГПЖ/СКС*	2010 ПГПЖ/СКС*
• ШВЕ	3094/879	2486/757
• ФРА	4310/856	3440/701
• ФИН	4165/1000	3556/815
• КАН	3642/852	3006/701

* На 100 000 граждан (Данные по здоровью ОЭСР, 2014 г.)

ВЫВОДЫ

1. Несмотря на то, что коэффициент смертности (СКС) может сохраняться на постоянном уровне, значения показателя ПГПЖ могут изменяться --> повышение значений ПГПЖ означает, что люди умирают в более раннем возрасте
2. СКС может быть высоким, несмотря на низкий показатель ПГПЖ → люди живут дольше
3. Хотя и значения показателя ПГПЖ, и СКС используются для описания смертности, их значение для расстановки приоритетов в политике здравоохранения различно
4. После снижения высоких значений СКС значения показателя ПГПЖ представляют более точную картину проблем общественного здоровья